

# SYFILIS

## STOP SYFILIS

### STOP SYFILIS

### STOP SYFILIS



Syfilis je pohlavne prenosná choroba.  
Infekciu vyvoláva baktéria *Treponema pallidum*.

### SYFILISOM SA MOŽNO NAKAZIŤ:


- **Pohlavným stykom** alebo **sexuálnym stykom** (medzi mužmi a ženami, ako aj medzi ženami navzájom, aj medzi mužmi navzájom)
- **Kontaminovanými (znečistenými) predmetmi, ktoré používa chorý na syfilis v čase, keď sa z jeho tela baktéria vylučuje** (zubnými kefkami, príbormi, riadom, uterákmi, oblečením a pod.)
- **Z nakazenej matky na plod počas tehotenstva** (vrodenný syfilis).
- Choroba sa prenáša z človeka na človeka slinami, semenom, vaginálnym výtokom, krvou, chorou kožou.

Syfilis môže byť vrodenný alebo získaný. Väčšina nakazených ľudí má získaný syfilis. Keď sa ochorenie včas rozpozná dá sa úplne vyliečiť. Neliečený syfilis však vedie až k smrti.

### VRODENÝ SYFILIS

sa môže preniesť z matky na plod počas tehotenstva. Ak sa tehotná žena nakazená syfilisom nelieči môže sa jej narodiť choré alebo mŕtve dieťa alebo dôjde k predčasnému potratu. Štvrtina nakazených detí sa rodí mŕtvych alebo umiera krátko po narodení. Až polovici neliečených žien so syfilisom sa rodia deti nakazené syfilisom. Takéto deti majú vážne poškodené srdce, mozog a oči.

### ZÍSKANÝ SYFILIS prebieha v troch hlavných štádiách:

1. **PRVÉ ŠTÁDIUM** - V mieste, kde vnikla do tela baktéria spôsobujúca syfilis vzniká nebolestivá, hladká a vypuklá vyrážka - **tvrdý nebolestivý vred**. Miestom vniknutia infekcie je najčastejšie penis, vonkajšie časti ženskej vagíny, vnútorné časti vagíny, okolie pohlavných orgánov, ústa alebo konečník. Do týždňa od vniknutia infekcie sa objavuje **nebolestivé zdureníe lymfatických uzlín** v blízkosti miesta vniknutia nákazy. Môžu, no nemusia sa objaviť **d'alšie príznaky**: slabosť, únava, zvýšenie teploty, bolesti: svalov, kostí, hlavy. Žena, ktorá je tehotná, môže syfilis preniesť na plod aj na svoje dieťa pri pôrode.
  2. **DRUHÉ ŠTÁDIUM** - Typické pre toto štádium syfilisu je zdureníe lymfatických uzlín na niektorých častiach tela (napr. na vnútornej strane rúk, spodku chodidiel, hrudníku, bruchu), na celom tele sa objavujú vyrážky, **flaky na koži a na sliznici v ústach**. Syfilis spôsobuje ochorenie aj iných orgánov (zápal kostí, zápal oka a iné). Dochádza k **vypadávaniu vlasov**, stráca sa pigment – dochádza k **zosvetleniu pokožky**. V okolí genitálií sa tvoria veľké ploché alebo vypuklé **sivobiele škvrny až otvorené ložiská**. Otvorené ložiská (rozpadajúce sa vrede) sú vysoko infekčné. V tomto štádiu sa môže už objaviť aj **horúčka, únava, bolesti hrdla a strata chuti do jedla**.
- 

3. **TRETIE ŠTÁDIUM** -V tomto štádiu sa u chorých na syfilis objavuje **poškodenie srdca a ciev, poškodenie kože, kostí a kĺbov**. Postihnutý je aj **mozog a nervová sústava**, čo často neskôr vedie k neurologickému zlyhaniu až demencii (strata pamäte, zmätenosť, nervozita, porucha schopnosti vyjadrovať myšlienky a pod.). V konečnom štádiu syfilisu človek slepne, stráca všetky reflexy, trpí únikom moču a stolice, je úplne dementný. Ochorenie končí smrťou.

# ŠÍRENIE SYFILISU UMOŽŇUJE TOTO RIZIKOVÉ SPRÁVANIE:



- Príležitostný, náhodný **NECHRÁNENÝ POHLAVNÝ STYK** s partnerom (bez kondómu), ktorého **zdravotný stav a predchádzajúce sexuálne správanie nám nie je známe**. Človek sa môže rovnako nakaziť pri vaginálnom, análnom alebo orálnom styku.
- Pri častom **STRIEDANÍ SEXUÁLNYCH PARTNEROV**
- **PROSTITÚCIA**
- **SEX BEZ OCHRANY (bez kondómu)**, ktoré umožňujú priamy kontakt a zároveň aj poškodenie slizníc. Človek sa môže nakaziť cez pohlavné orgány, konečník, ústa.
- **Injekčné užívanie drog** – podávanie drog použitou ihlou, striekačkou alebo použitím spoločného roztoku drogy s iným človekom.
- **Tetovanie** alebo prepichovanie kože (piercing) s použitím ihiel a predmetov, ktoré neboli pred poranením kože sterilné.

## AKO SA CHRÁNIŤ PRED SYFILISOM A INOU POHLAVNOU INFEKCIOU?



- **NAJISTEJŠIA OCHRANA JE SEX S OSOBOU, KTOREJ ZDRAVOTNÝ STAV JE PARTNEROVI ZNÁMY.**
- **NAJLEPŠOU PREVENCIOU** a súčasne aj ochranou je vzťah dvoch ľudí založený na vzájomnej **VERNOSTI**.
- V prípade striedania sexuálnych partnerov je potrebné dodržiavať **zásady bezpečného sexu**:
  - **používať prezervatív (kondóm)**
  - **používať menej rizikové sexuálne praktiky**, pri ktorých nedôjde k vniknutiu semena, pošvovej tekutiny alebo krvi do tela alebo na sliznice pohlavných orgánov, či úst partnera.
- V prípade vnútro-žilového užívania drog **používať vlastnú ihlu, striekačku a roztok drogy. Normálne je drogy neužívať !!!**
- Treba **poznať zdravotný stav seba i svojho partnera**, najlepšie ešte pred sexuálnym stykom. Čím skôr človek zistí, že je nakazený syfilisom, tým skôr môže vyhľadať odborníka a vyliečiť sa.

